

Konference om borderline

Diagnose og behandling: Data fra de danske registre


Jesper Nørgaard Kjær, stud.med.

Psykiatrisk Forskerakademi, Afdeling Q, Aarhus Universitetshospital, Risskov



Christiansborg 3. februar 2016

Figure 1: Borderline personality disorder as main diagnosis



Konklusioner

- Borderline er en bred diagnose
- Patientgruppen har en høj dødelighed
- Lange, komplicerede patientforløb

Borderline er en bred diagnose

Table 1. First-ever and latest diagnosis of all patients in the sample

ICD-10 Main diagnosis	First-ever: 1995-2010		Latest: 1995-2012	
	Female	Male	Female	Male
	%	(n)	%	(n)
F60.31	30,5	(2862)	35,8	(504)
			47,2	(4143)
F60.31				33,8
				(432)
F10.x	1,5	(142)	6,0	(84)
F11-F19.x + F55.x	1,8	(166)	5,0	(70)
			1,5	(130)
				3,0
				(38)
F20-F29.x	2,6	(247)	4,4	(62)
F23.x	1,5	(139)	1,6	(23)
			0,4	(37)
				0,3
				(4)
F30-F31.x	0,7	(67)	0,9	(12)
F32-F34.x	14,7	(1378)	9,4	(132)
			2,6	(230)
				4,1
				(53)
F40-F42.x	4,5	(423)	4,0	(56)
F43.x	16,6	(1561)	12,2	(171)
F52.x	4,5	(426)	0,5	(7)
			1,9	(164)
				-
				(0)
F60.3	5,0	(472)	4,2	(59)
F60.0-F60.7	1,6	(150)	2,4	(34)
F60.8-F60.9 + F61	6,3	(587)	5,7	(80)
			5,8	(513)
				4,4
				(56)
F90.x + F98.8	0,6	(56)	0,7	(10)
			1,9	(163)
				1,5
				(19)
F99	1,8	(168)	1,8	(26)
Others	5,7	(535)	5,5	(77)
			1,2	(105)
				0,6
				(8)
Total		(9379)		(1407)
				(8786)
				(1278)

Diagnose: Emotionelt Ustabil Personlighedsforstyrrelse

Impulsive type: 3 eller flere symptomer:


- Tendens til at handle impulsivt (svag impuls kontrol)
- Tendens til at gå i forsvar ved følt pres/stress
- Hurtige følelsesmæssige svingninger (følelsesudbrud)
- Manglende udholdenhed
- Ustabilt og svingende humør

Borderline-type: Mindst to af følgende symptomer:

- Forstyrret og usikker identitetsfølelse
- Tendens til intense og ustabile forhold til andre
- Udtalt tendens til at undgå at blive ladet alene
- Tendens til selvdestruktivitet
- Gennemgående tomhedsfølelse

Høj dødelighed

Standardized mortality ratio (SMR) of psychiatric patients diagnosed with borderline compared to the Danish population 1995-2011



Høj dødelighed

	Kvinder	%	Mænd	%
Naturlig død	198	51,4	77	49,0
Selv mord	104	27,0	36	22,9
Drab	8	2,1	9	5,7
Ulykker	52	13,5	19	12,1
Ukendt	23	6,0	16	10,2
Total	385	*3.9	157	*10.6

*procent af samlet patientgruppe

Lange patientforløb

Table 2. The percentage of contacts with BPD diagnosis

Number of contacts	BPD-%	Patients	Total contacts
1	100,0	938	938
2	65,9	1116	2232
3	51,6	1205	3615
4	44,1	975	3900
5	41,8	914	4570
6	38,5	741	4446
7	36,2	685	4795
8	34,9	538	4304
9	34,9	488	4392
10	33,3	394	3940
11-20	29,1	1955	28392
>20	25,4	1501	66192

Konklusioner

- Borderline er en bred diagnose
- Patientgruppen har en høj dødelighed
- Lange, komplicerede patientforløb

Referencer

Ørts Clemmensen, L. M., Jensen, S. O. W., Zanarini, M. C., Skadhede, S. & Munk-Jørgensen, P. (2013) **Changes in Treated Incidence of Borderline Personality Disorder in Denmark: 1970-2009.** *Can J Psychiatry* 58(9):522–28.

Kjær, J. N., Biskin, R., Vestergaard, C., Gustafsson, L. N., Munk-Jørgensen, P. (2016) **The Clinical Trajectory of Patients with Borderline Personality Disorder** (accepteret til publikation).

Kjær, J. N., Biskin, R., Vestergaard, C., Gustafsson, L. N., Munk-Jørgensen, P. (2016) **The Mortality of Hospital Treated Borderline Personality Disorder** (review).

Kontakt mig, hvis I har spørgsmål til resultaterne eller gerne vil høre mere om vores forskning.

Jesper Nørgaard Kjær
Medicinstuderende ved Aarhus Universitet
Email: jespka@rm.dk
www.psychiatricresearchacademy.org